庫全書

子部

欽定四庫全書

續名醫類案卷四十五

子部

詳校官不断院告官臣養晟 編修臣倉聖脈覆勘

校對官中書 日到源溥 總校官編修 臣王燕緒 腾銀監生日陳 箴

火亡の巨人馬 件光治一 潮熱有用鷄胜肝花粉威靈仙煮食其瞳神即高 石醫類案卷四 兒痘目 全書 白腈紅腫徐用為青九煎服魚用羽皇散五 兒痘后目黑睛初起細白點大便順而日 續名醫類案 錢唐魏之琇撰

萬密齊治蕭別駕女痘后不戒厚味其俗有病者必服 兒白精生翳斯掩黑精連用去風去翳凉血清熱等 附子食雄鶏靈屬元戒之不聽后两日出淚爛弦 藥不效即用為青九及羽皇散問服數劑而安 **泰發於肝肝火旺也或曰目上下胞属脾脾亦熱乎** 舊不食草 鹽酒焙乾白 蒺藜各一两谷精草石决明 넴 各二两旋覆草蟬蜕川芳龍膽草各五錢羊膽三 蜜九每服二錢鹽湯下羽皇 表四 散

雷色还孫痘七日倒陷已與發出毒猶甚欲解其毒中 次定四軍全對 王司訓子痘後两目畏明此肝大太旺宜服為肝散加 加柴胡黄芩密蒙花蜜九服半年而愈 曰此因淚出不止浸淫潰爛也乃用瀉青九去大黃 如節飲食適寒温以待自安不聽乃服參茂温補之 氣素虚又致倒陷欲補其中恐助毒火又傷其目不 柴胡蟬退黃孝初一劑用酒浸大黃乃畏苦不肯服 劑 後两日俱盲 續名醫類米

周氏女痘後目閉不開曰痘順無餘毒必羞明症也乃 蕭氏子症後目有白翳曰此痘瘢也治之無功果盲 徐淑道痘不靨用陳氏木香散一服曰誤也必损目 試之向暗則開向明則閉不流淚此肝火邪未除耳 用羌防歸尾川芎柴胡蔓荆密蒙花生甘草淡竹葉 果盲其 果成内障目盲 服目開遍身處藏腫凸再用四物湯加荆防人參 表四 矣

周氏子九歲痘後出外忽頭腫兩目不開此非毒乃風 熱也用羌防升柴芎歸藁本蔓荆細辛甘菊黄芩治 連翹甘草而愈

王肯堂治從子懋語症後兩目生翳差明持甚窗牖皆 之愈 以衣被覆蔽就明展兩眸視之則白膜已遍覆黑睛 淚如泉涌嬰科眼科投藥不效東手告技窮矣乃閉

火之の草之

19

續名醫斯案

户而思目者清陽之所越也忽馬而有翳膜是濁陰

費建中治一女三歲痘稀而紋突紅潤似可弗樂但 清陽之氣為君生地當歸養目真血為臣羌獨防芎 犯之也濁陰安敢與陽敵故羞明特甚乃以黄茂助 **芷甘菊薄荷升清陽黄芩猪膽汁車前茯苓降濁陰** 為佐仍問服瀉青九八 柔脆點洗之藥必有所傷故也 點洗藥概屏不用橄欖核磨汁敷上皮而己益嬰幼 如炮叫喊不絕左目掀腫如桃以大黃生地荆芥 劑] 而目開弱已去矣凡眼 刻

徐仲光治一兒痘桐密未起發而唇先黃熟目先虚 兒痘四朝稠密未起脹而口唇先黃熟乃內潰之惡 **芥陳皮人中黃等清利四腸解其脾毒而愈** 咽 甘菊赤芍黄連木通地丁青皮自三朝及十四朝始 眶口唇雖腫而紅活以甘桔湯加牛蒡連翹山查荆 身凉回好目亦無恙 **帳腫痛不能飲食編身症俱平暗幸正頻匀的眼** 痘 俖 归涯 阴

大足の時心的

1

结石醫類茶

兒痘 服 候 湯 層又一層皮薄空浆破 但能食安静 必為唇刺幸 Ŋ 十四 補 理 獑 稠 中湯而愈 中益氣湯去白木加牛蒡連 甦 朝 如級栗平場婚 而愈 肢 厥脉 有胃氣 餘痘光澤脚飲 沁 靜 也用參本連各二錢日進 如死狀症皆倒隱心胸 紅 如血汁 血 散 不 胛 附 **溏泻烦渴皆為迷** 翹山查繼以保 跳受毒根 唇口 腫 硬 木 剥落 稍 温 元 固

大心の野心島 徐仲光曰一兒患血熱痘後身發熱口臭成疳潰脱上 若面腫而帶青紫色為實熱必成馬疳潰類不治矣 花蒂丁及牛黄散一二服或煎銀花一兩入廣膠 連黃孝元參生地牛蒡桔梗甘草白芍花粉木通紫 今雖腫而紅活知為另發癰也內服犀角羚羊角黄 狀 齦門牙左顋盤牙唇紅乾裂左颊下亦紅腫如發毒 湖州沈三春外用柳陽散加葱汁潤漿調敷腫處 痘 口疳 結名階期案 瓦一

徐 多ジャルノイマ 仲光治一兒患血熱痘先用寒凉苓連犀角起發灌 背 錢問楹甘菊花根葉汁冲入服之面腫漸平身熱漸 徐 四分又常以醋調雄黃末軟筆點入潰竅中延至月 退外吹牛黄一分珍珠三分贵罄青黛人中白硼 猪 膽製各四分不易做加烏梅炭三分血竭二分龍 而愈 应 一分因體虚又加人參象皮灰三黃製蘆甘石各 叫痛 砂

莠射干元参而愈 風痰壅盛先以桐油探吐服駝原散甘桔湯連翹牛 兒症後咽痛壅塞不通此餘毒留於心肺 歸白菊紅花生地山查陳皮蚯蚓牛蒡川連黄芩甘 草而愈 灰見熱渴燥煩大便溏泄多次咽喉 栵 **媽山豆根麥冬川貝桔梗元參防風僵蠶山甲當** 腫痛改用清咽 邪熱不泄

漿頭面身背俱濃但兩腿 面凹陷不起用參送托之

火足四草全

續名醫類集

六

多ジロ 兒痘後咽喉成疔以柴葛地蜈蚣等分煎成加犀角 兒痘後脾胃不足陰大上炎咽喉腫 痛以四君子加 寒次宜肚水之主六味地黄九加知母麥冬元參治 兒痘後真陰不足二火上行咽喉腫痛有以寒凉 其本治外吹葛槿散而愈 者愈而復腫原其火為寒鬱先以附子理中湯驅其 梗 汁和服而愈 知縣川連牛夢而愈 治

少定四軍全書 一 萬密齊媳李氏年十八痘成膿時經水忽行下血塊且 萬密齊治馬氏子五歲痘不起發曰此順痘也毒甚者 宜有猝失音之在今已成膿飽淌紅潤何以有此逆 以甘桔湯加牛蒡子煎細細咽之咽痛即止 多未踰日猝失音問之但搖頭垂淚凡痘帶黑歸野 曰此痘家常病喜喉舌無瘡頸項問痘稀不足怪也 則頭面腫毒微者則頭不腫非不起發也又呼咽痛 痘瘖 續名醫類來

蕭氏子三歲出症将屬時忽失音啼哭有聲但言語 陰之脉不紫於舌也手少陰者心也心主血諸瘡皆 獨不清亮曰此肺熱也以甘桔清金散服之而安 舌者心之苗血去則心虚不能上榮於舌故舌萎縮 属於心瘡毒之火內起於心迫血下行改經血來也 而猝失音也乃以生血散去五味子加當歸生地服 庭思之良久乃得之經云婦人重身九月而府者少 之煩愈後以十全大補湯調理而起 1: 1: 1 重

てこうこれ しょう 徐仲光治一兒症十朝外左上酿潰爛外颊紅腫外治 按之而疼外治硼砂一錢五分膽糟五分麝半分燒 夢芳桔連斧歸为先以銀花一兩煎汁煎之頰腫口 服紫花地丁花粉生地丹皮元参山慈菇貝母翹防 酒 疳漸平月餘忽發夜熱左腮下生一核大如李色白 用抑陽散同葱汁酒浆搖敷每日一換不用紙封內 薄薄調勾新筆雕塗内服举羌 翹夢甘均元參前 痘 發枝 . 婚名的頻米

動戶四屆全書 徐仲光治一症未盡出而腹痛嗳腐吞酸大便酸臭乃 庭起脹時不易行漿肢冷腹痛乃血熱症而過冷劑 庭後傷食腹痛本中氣不足宜補瀉問施香砂保脾 理中湯加肉桂木香炮薑一劑而 飲食停滞也你和九二服而愈 胡貝母膽草山極亦以夏枯草一两煎汁煎之連進 四五劑而愈 疽 腹痛 太 愈

症後能食易化腹痛此胃熱易機脾弱不能消磨鬱 積而痛也補中益氣湯加芍藥木香黃連治之而愈 九人補中益氣湯調理而愈

而愈 痘漿足不易靨腹脹發熱百赤午後益甚按之腹不 痛乃脾虚血少也歸芍六君子湯加陳皮棗薑数劑

費建中治錢銓部女平時内熱柴瘦仲夏痘而熾熱股

とこのは たたっ

痛異常不能轉側口極機紫滞稠密但不細碎幸初

好名醫 数果

多只四月在書 錢黃連一錢佐以山查荆芥葛根亦为桃仁地丁紅 起毒雖惡未有定位以大黃四錢石膏七錢生地六 皆枕許而腹痛與熱依然至十八日始大轉自始至 黄一分殊末二分十二日頭而發臭方日進粥三次 熾熱尤甚眼封而角流血譫語不寐不食前方如犀 角倍大生地石膏減猪尾血臨服以化毒丹調入牛 花地龍臨服和猪尾膏盡許服至六日色漸肥紅放 **行腹痛少緩餘未減仍前方至九日聚甚充而腹痛** 1 表心

徐 渴 加杞子杜仲與升發之樂問服痛止痘出至六朝 仲光治一库友年十八初熱腰痛點發在頻角紅绽 光澤心經順症非野遂候亦宜滋野六味地黄九 症腰痛 保元湯加歸芍冬把聚仁龍眼內問服八味地 證妄唇燥舌黑腫即不寧此乃賢水不足以制 方收效如此治驗多矣即舉此以概其餘 煩

史之四華全書

~

續名醫類案 有

加麥枸杞漸

愈

症同但補陽而不滋陰

黄

兒 兒孟夏發熱腰痛甚見點稠密紫黑幸有神而胃氣 兒 强元氣實雖逆而尚有生理四朝以四牙散一 毒逆候也急以四牙散發出紫黑點五日死 出點如蚤斑口鼻出血而死 點如筋頭大平而紫又舌中心一點 球而黑此野 初熟腰痛連背脊不能轉側點見左耳側及腰 初熱腰痛如折此折腰症也强以荆防敗毒散發 涸 疤粘不 脱 而 死 表 服 又 左

女年十四症正聚足忽腰痛不能轉側此經血去多 以獨聖湯賴服及八味地黄九而愈 開無光汗出遺尿喉聲如鋸六脉浮大此恣然房勞 男子年十八症後四十日外忽腰痛極兩手撒椒 連解毒湯加柴莠歸芍地黄而愈 而陰陽離次也以父灸氣海六十二壮四肢活動又 之故六味地黄九加歸芍 續斷杜仲治之而愈 化毒散送下地黄九二服次日痘起但色未轉以黄 E)

火之四軍至雪

Ţ

橋名醫類集

多りである。 好症紋胡而色淡紅兩腿痛甚腿亦属腎此陰虚而 痘不起而腰痛繆仲淳用人参蘆三兩煎服一吐 男子年二十痘後腰痛左尺脉微弱房勞所致也以 紫而死與腰痛之逆相不可輕視之也 黃九間服而愈此症不早治及四肢厥冷則變黑變 **毒乘之也活命飲二劑痛稍止十全大補湯六味地** 痘起痛止毒在下吐以升之吐有發散之義也底筆 味地黄丸補中益氣湯相問服而愈 而

萬密齊治一富家子年十六忠症發熱腰疼問魯婚 愈 枯少水不勝大野氣熱也灸崑崙穴中脉穴各三壯 兒年十四痘後腰脊痛不能俯仰午後潮熱此骨髓 蹄为四君子湯加牛膝獨活於仁桂枝連進數服而 兒痘後足脛痛甚不紅腫氣血虚不能紫養筋骨也 曰未也連進人參敗毒散二劑痛止痘出而安若 以六味地黄九加獨活及補中益氣湯問服而愈 魯

たこの巨心的

Į.

衛名醫類茶

多少口乃人一 費建中治章繼美年近三旬季冬忽腰如杖昏愦如迷 李季虬曰顧叔夏次郎出痘而先腰痛子斷以不治果 問之不答身體振振內閥筋惕痘之象也但腰如被 獨施季泉曰凡成婚或破陽後出痘而腰痛者可療 童子而腰痛是先天之水不足也不治旗軍 有房室者不可治也或以大 錢佐以荆芥乾葛元參乘初起預攻庶望轉機於 其症必逆用大黄山查各六錢青皮羌活桃仁谷 拿劑手場 按與

火已日年心馬 四 **夢紅花桃仁蟬蛻等加白頸地龍舟劑十條又以猪** 色既逆神情又惡解勿治因苦懇乃用大黄八錢 煎次早發出如於如砂色焦紫上下無容針之隙形 萬一若見痘腎已受傷無及矣自申至夘連服二頭 尾膏半盏和入連進二劑次日如於如砂并焦黑色 Ł 雞圆綻如殊發黃如腦而昏熱如故大便日六 两黄連二錢生地兩半佐以荆芥羌活為根牛 類粒分明紅活但密而神昏熱熾前方服之九 特名問知來

多只口 十五日諸症悉愈痂如松皮後又口疳齒牙幾落又 四錢佐以牛莠荆芥甘草十二日胃忽開神爽熱和 傷胃則氣血之矣聚何由得至十日正面有回意仍 祉 服牛黃硃末并黃連解毒湯十餘劑漸愈月外又發 不思食乃用大黄石膏各一两生地两半黄連山查 危疑之際旁議紛紛幸病家有識故得收效云 風瘡身無完膚此的性死将百日始霍然是症當 而不暢水米不沾議者謂寒凉大過曰如果蕩滌 Ŀ

火之四草公野 徐仲光治一兒症後鴻泄腿腫睡即不寧足三陰虚也 陰虚邪襲之也驅風散問八味九及任牛膝 兒痘先從脚底出起逆上至頭面回至心寫內攻而 兒症後勞役痢雖愈而脛膝結核成鶴膝風此足三 死此症早治俟其頭面出齊重用升提保元湯加 四君子湯加陳皮歸芍枸杞澤瀉石斛川牛膝繼以 庭手足 味九而愈 續名醫额某

芎及先設心以黃連解毒湯一劑使其起灌收痂自 續名醫類案卷四十 上而下可保無事 各四十

欠己の手合 徐仲光曰 欽定四庫全書 陷也若得人事清爽飲食如常痘無损處宜補中益 氣湯歸茸湯主之若喘脹嘔泄煩悶外剥者不治 續名醫類案卷四十 症腺期 庭漿充滿根血淡紅痰涎壅盛日脯潮熱皆謂 痘養聚而內却無水乾涸空虚此氣虚伏 7 **绮名醫類集** 錢唐魏之琇撰

多クロガスで 陰虚火甚生疾也以六味地黃九料內加參附內桂 不足以保元加芎歸貝毋陳皮治之不愈不知此 中湯愈或加肉果 温之而疾絕熱去又與補中益氣湯而愈 脾胃氣虚也以大保元湯主之又歸茸湯益之 充淌痰盛少食便溏此乃脾胃虚弱不能運化精 泄寫身於自汗此乃脾胃氣虚也以保元合附子 液凝滞所致以六君子湯如炮薑 痘漿不易充足而色淡白亦 痘漿足忽 痘漿 理

火足四年全馬 獨根窠斂束以保元加山甲官桂又以水楊浴洗頭 朝空地補出贈症俱行疑又與異功散而愈 無疑自口以下俱紅紋能食便溏乃元氣不足不能 面手足良久復起成膿而愈 如麪薄只以参苓白术散主之一痘七日無漿倒靨 保元加白术白芍陳皮官桂蓮肉牧厚靨而愈若收 痘漿足而色不易蒼臈乃脾弱之故脾主結痂也用 一升於面以保元加白术白芍官桂肉果升麻十 T. 好名時類茶 痘九日平面平塌 瓬

多ジセノ 不足不能根作 陰不足不能以充灌用參於白木散加附子免絲肉 Œ 功 灰 五處而愈經四發離發行者生也 果又與河車散 顶 散治愈若治之不止反加昏問者死 白色泄寫煩渴咬牙寒戰此乃氣血虚寒也以 面漿足結如身收無漿能食便鴻完報不化 陷漿滯不行色見焦紫乃風寒壅腠理氣滞血 以制具毒用補中益氣治之發疗 而愈 庭 日空殼無疑因氣 短八日例 疽 73 朝 靨 凹 ሥ 加

大己の長んち 量氣血充足的為風寒所閉則可浴若浴后不起又 脾主因因便而脾虚倦息而昏睡也歸脾湯如白芍 カロ 藥氣藉湯氣上升毒隨緩氣而發若兒弱只浴頭面 紫能食便調此是火迫而收之太急乃倒屬也投 山藥米仁蓮肉愈 手足痘即光潤隨服補中益氣湯調理凡用此湯類 之故宜升提發散之劑內服紫蘇使外浴水楊湯 悶亂者死 7 痘養漿時昏睡不姓便海能食 婚名留夠茶 **痘聚充足忽爾一齊結痂乾** 73

多万世月 滞不行此乃血熱未解 能化聚也 皆云氣虚而津液不足以保元加麥冬治之愈甚聚 之義更以犀角地黄湯又四順清京飲利之前症悉 補魚攻發之劑十四日四肢腫痛成癰膿成毒化若 平聚滿而愈經口毒未盡解而温 不食便鴻城党則為內虚倒隱毒歸於內喘脹而 症聚不易充足根血亦色煩渴溺潘舌燥便 庭九朝而死棄之沙灘視其手足動 温 補反助其邪乃火盛水 補則毒益盛而 涸 秘 卒 不

てこうえ ここげ 愈 大黃當歸亦芍甘草之類一劑又與犀角地黃湯而 多睡益心主血血虚邪乘而入心神昏亂之故宜犀 濇煩躁飲水或用清解之劑未應乃熱毒內鬱也以 亦有得土氣而解者 氣而火減故復甦也抱回治以犀角地黃湯而愈 掣色雖焦紫形尚綻突乃毒火悶瞀一時而死得水 角地黄湯安神凡若治而不己者至二十日而卒若 **痘養漿時大便下血或尿血或神昏不醒或** 简名醫問家 痘七日根窠亦痛便秘溺

一分定四库全書 萬密齊治汪氏子症出膿成時頭面腹背皆飽滿惟手 者心膽人熾也以犀角地黃加柴胡龍膽治愈 湯加翹夢愈 服睡至七朝尚未安寧視其形色俱順而妄言中立 足膿俱紫黑熱甚便秘乃血熱毒壅也以黃連解毒 毒盡外出當以補中益氣湯如麥冬聚仁 何甚弱也乃由去胎失乳故用建中湯加黄芪防風 足自肘膝至掌指猶未起發曰脾主四肢此子脾胃 女季春患痘妄言卓立日夜不得 痘浆

くこうえ 徐 啾 仲光治一症聚足結痂忽爾紫黑穢氣也以十全大 **麩簿粘皮不脱昏睡内熱** 補加木香治之而愈 於神未出痘神先降壇云吾保汝子痘出必少至是 痘出甚密乃以計逐之使去 服盡起脹作朧矣其家信奉魯湖黑神此子寄名 乃風寒客肺也麻黃湯得微汗而愈 痘 1.1. 屬期 附 痂后 崎名醫類案 痘妆痂厚而乾黑身熱咳 乃脾虚少血之故以調 痘痂 如 邶

一好定四库全書 脱身熱煩渴擔語妄言腫即不寧乃陰虚火甚也以 四 諸症悉平病充漸脱而愈此乃毒火彌熾之故經 養柴湯治之 IE, 火盛則水涸此之謂也 腄 物湯合生脉散加聚仁 氣不足不能化毒盡解以補中益氣湯加山樂 **卧不寧有以氣血不足大補之四七日枯槁 痘如前以犀角地黄湯加翹夢治之火漸減** 痘收屬乾黑粘皮不脱身熱煩 表:四; 痘痂厚而乾黑粘皮 痘清漿結死如麩 而卒 治 曰 73 不 而 冯

恃其順而恣與之食以致肚腹脹痛停漿色滞用消 内虚倒靨漿復化為水而始行補氣不效喘脹而卒 當與調脾益氣助漿收敛竟不從治延至十四日漸 化樂而便行安和痘漿不長乃食物雖消正氣受傷 減食乃中氣不足用參苓白术散加肉果陳倉米愈 两曲池發靡成腺而愈 痘至十日十一日頭 面将結亦 粮殺尚未充足 兒九歲出痘勾朗紋突九日漿足能食便溏乃 納石附納茶 痘屬淡白如麩便海

及己口東公島 · 一

多ジロバ ハマ 補 疤充足 當痴不痴又作寒戰咬牙只是不足治以温 牙以十全大補湯加附子愈 至十四五日偏身結痂而充但是足下未焦寒戰咬 而愈 只是氣虚不能托毒於外急以木香散加黃茂蟬退 服白虎湯一劑而愈 滿頭温足冷以木香散加附子酒茂而愈 在如前項突 根紋此是陽火有餘胃氣大熱 痘十二三日上身已結痂下身尚灰白不 附 痘痂脱盡正頻一 痘至十五六日腺 疽 瓬

萬密齊治胡氏長女症甚密膿成過期不屬此女平日 之七四年と与 胡氏子症甚密膿成不靨漸至潰爛自起發以來未得 溃而不效四九日作痒破出臭膿而聲啞問亂而死. 盖許亦聲啞問亂而死 脾虚食少性不服湯劑以錢氏異功散加木香青皮 蜜九米飲下調理而安 大便此裡熱鬱蒸故不成痴欲下之彼謂此子素弱 痘如盡脱頭上一痘不飲二十八朝忽痒甚出姐 **3** 好名野類茶

多プロト 小兒因渴飲水過多濕傷脾胃不靨以四君子湯人 餘枚如彈子大東入笑曰此法更妙症即收靨至腰 無燥矢至次日痘益潰爛乃用膽導法下燥矢三十 顷腹中鸣而利下清水泉皆稱妙因思久未更衣豈 不可下時有街士符水甚驗乃書一符焚而服之少 参補中白木燥濕茯苓渗水甘草解毒加防風以勝 四枚后皆溏屎症盡收而安 不收益大便下后人未行也再用膽等去燥矢十

2 1. Jo .m 蔡氏子痘密膿成過期不屬面瘡潰腫起止呻吟館水 小兒泄寫不止食少此裡虚不能成痴用陳氏異功 開結生甘草以和中得利而安 用當歸稍生地以京血麻仁以潤燥酒大黄以寫熱 散合肉蔻几而愈 小兒大便不通熱蒸於內而生濕致浸溫不能成痂 水之邪砂仁以温胃止渴調理而安 皮毛之濕白芷以逐肌肉之水桂以利關節而去寒 \.\.j 時名醫類案

猶實膿血此則面平目開皮脱肉乾二也彼喉舌 問故曰彼過期宜屬此未成膿不宜屬一也彼腫脹 葉煎湯下調理而安時降居一兒症同謂不可治或 **莠白蒺藜何首烏荆芥穗等分為末酒糊為九淡竹** 過身皆然非倒屬也愈水嘔食者口唇腫硬瓜煎 非失音也瘡毒盡表病裡和可治也用苦參酒浸牛 食語音不清或謂不治視其面瘡腫起正在實膿 非咽喉潰爛也語音不清者鼻中壅塞氣不得通 不

多分四年全世

表 i 四,十

July 10 1. Lin 胡氏女十三歲痘甚密或與參茂大補之二十日後過 甚時值夏火正旺之時用黄芩以瀉肺中之火解時 夢甘草解鬱蒸之毒肺主皮毛因黃茂之補肺熱己 **投乃用判防升麻以解表白芷以蝕膿逐水連翹牛** 毒不解急宜解表勿使皮肉腐爛不信又踰五日不 期不醫已潰爛幸非倒醫乃温補過多裡邪盡出表 服之無效死 瘡此則明舌潰爛嗆水失音三也彼私與祭氏束樂 **临名醫類案**

銀灰四库全書 盧文學妻李氏症甚密未及成膿面瘡自破皮腫膿聚 吳氏子三歲出庭毒氣有餘穀氣不足食少故不屬也 小兒屬后又出一層小痘其家驚憂曰住北也痘 惡恐不得痊二十餘日殞 痘最輕且無餘毒發己盡矣果然 氣多腥臭過期不靨飲食漸少鎖喉嗆水曰形症俱 令之熱調理一月而安 云輕者作三四次出大小不一等重者一齊涌出此

欠己日及 /idelo 盛那火殺穀名曰除中生婚循膏之将滅火大明而 小兒靨后痂皮不脱曰此脾肺二經不足也益肺主 皮毛脾主肌肉具氣不足故痴難脱用錢氏異功散 后熄死在旦夕也果然 而今思食白少如多胃氣復也今忽多食乃胃敗火 思食所食且多曰死急矣問故曰謂能食者久不食 黄芪桂而愈 服何藥口無藥可解能食則生不能食則死次日 **村名醫類茶**

多少口厅 兒痘后一身畫屬痂皮畫脱惟頭與足不屬口此常 陽諸陰皆會於足乃陰中之陰謂之寒陰孤陽不生 其色白當用參茂大補之劑否則有變不信謂痘己 者寒陰無陽也久當自座但是遅耳以久 寒陰不育所以頭瘡不收者孤陽無陰也足瘡不收 候也不必治益諸陽皆聚於頭乃陽中之陽謂之狐 完何變之有一月后大喘而死 兒痴落后其般色白曰此氣如虚也肺為氣之主 石書

雷邑丞孫痘落病月餘面藏凸腫今始發洩也凡毒自 小兒落痴后瘕内凸起作痒此風熱也用人參敗毒 散 蟬退升麻作散淡竹葉煎湯調服安 内而外者吉乃用當歸稍赤芍荆防連翹牛莠元參 手拇指不得自脱故皮肉受傷而復作瘡以苦參九 參服之外用水楊湯皆效 , 兒落痴后瘢腫復成瘡久不愈此痘毒瘡也由犯 加判防一服安后有患此者用荆芥取毒散加人

火飞马尾(ME)

埼名醫類茶

多プログノイラ 王氏女痴落遍身盡白色不紅日夜啼哭遍身潮熱不 小兒落病后廠毒不平曰症家戒食薑恐屬不齊廠 與服效 成疳而死不信后果殁后其子亦患此令服十全大 思乳食曰此症若不急治或一二月或二三年必致 補湯數劑又與三合湯治之其熟即退哭亦止痂肉 色盡紅方止藥人服加減八寶湯全愈 不平也問之果然

こくこつ いろんしい 徐仲光治 次日如犀角連翹黑色俱散唇眼俱清前方連進四 勢少緩又用黃連生地紅麵各錢木香三分燈心錢 腎面唇腰脚皮內俱黑仍用前藥加金汁及人 牙散 地 不可為矣道日亡旗 小兒已脱痂初無他苦一醫視其目睛無神帶白曰 翹紅幾起脹灌漿至半漿又不服藥九朝變黑歸 痘 附伙倒陷压症 一血熱痘初失凉解至五六日方服芩連歸 V **场名陽頻果** 筆 <u>+</u>

多方四月全書 具氏女症将膿面上有乾醫者犯例陷逆症乃用參於 李氏子四歲出庭十日后痘頂平陷根窠紅紫昏睡不 萬密齊治具氏子磊落紅活順痘也其兒脾胃素弱起 甘草節歸地赤巧銀花牛莠連翹麻黃酒蜜拌炒黑 劑而愈 不起又投陳氏異功散一劑再延視不可為矣 食不可敕也次日死 發界遅或謂其氣虚妄投陳氏木香散一劑痘轉平 表 四十

CA 10 12 1.15 雷邑丞孫五歲出痘衣以厚鄉圍以厚被日夜向火 作膿 起 曰 其飲酒未七日而靨面目至腰潰爛平塌無作痂 服 紅花子水煎服山甲末且告之口服后若先乾者復 癰后以十全大補湯加銀花連翹調理而安 此 作膿未或者肚肚紅飽滿空處再出小痘上也 己乾者不腫未乾者飽膿空中補出不多手足發 非止是倒屬也亟用陳裡解毒之樂減去衣 不補空或發雞腫次也否則不 . **墳名醫額聚** 可為矣連進 + 者 任 Ξ

銀定四扇全書 董氏女年十九勝月半出痘至歲終不得收屬精神己 服 得壞瘡復起新痘復出人事清爽飲食如常則無 昏飲食俱廢視之僵即如死人其脉洪實調匀此 樂恐生化病也 蟬退以球表青皮桔梗以球裡牛蒡甘草以解毒一 倒屬逆症幸脉洪實不疾不徐今棄症從脉治之若 潰瘡復脹大便膿涎此毒氣中外無留矣戒勿再 近火飲酒方保無事以黄茂白並排膿托裡防風 木

とこのほんか 柴氏婦二十七歲症甚密膿成時鼻準先乾口此症凶 也不可治問故曰起發未透膿漿未熟不當靨也况 果喪明 九 當防目疾宜預解之不聽半月后左目痛不能開 屬后以十全大補湯調理謂痘倒屬必歸肾今幸愈 舸初三日復出一層新痘舊者盡乾初五日出盡周 匝一身乃漸甦省能言求飲食依期起發至十三日 矣乃用升陽散火湯加黄茂當婦木香清皮連進三 婚名騎類茶

徐 多河口屋有言 而愈 仲光治一兒聚足為穢氣觸倒靨焦黑四肢腫痛幸 三日死 其能食便調正不留邪必發癰也用內托解毒之劑 堆膿面瘡皆然自項而下則成在殼分症未熟面靨 收屬自有次第形色亦殊先自口唇两傍收起漏浆 乃倒陷也自鼻先收失其序也不漏漿者乾枯也 疽毒 后

戰作痒危甚此急治其表而失於補托也保元湯加 兒五朝两臂腫痛用解散藥而聚不充毒不退灰寒 兒痘症相同不補漿雖滿施腫處成膿竟损一目 而愈 兒七朝痘順有行漿之勢兩劈膊腫大如瓜幸能食 参茂甘桂歸芍陳芷芜活人中黄治之聚足腫漸消 丁桂术橘治之漿足而痂后以托解樂其毒成膿而 調此少陽經虚毒滯不散也補其陽而腫自愈用

大三日月白書 蜀

給名問期來

五

東プロ人名言 痘密而內强過於補益而生癰腫煩燥口渴便秘以 兒患症鄉於小腿歲餘尚溃腐不能收口此至陰之 兒痘毒流注四五個於肩臂痴如起薄少神粘著不 愈 收口而愈益毒人不散凝結骨中與地四生金之義同 金内托散加牛膝檳榔土茯苓首鳥潰出一娥骨 下無陽氣充柘腺血既久氣寒虚弱宜補助元氣 三黄九利之再用清 解之劑調理腫 消而愈 漸

膏鐵箍散圍吸筒吸膿而愈 耳后赤腫結核寒熱頭疼體痛此感冒不正之氣所 痘大腿腫痛此毒火鬱於肉分丹腫也用歸芍丹地 **痘毒出清水六脉微弱元氣虚寒保元湯加桂附** 脱 木 翹芷木瓜大黄 乃時毒也十神解毒湯治之而愈 此氣血不足也十宣托裡散外用針刺破又玉龍 調理而愈 白

PLOTE LITE

婚名醫類染

ナ

動方四角在書 痘聚雖滿而四肢清薄水痂薄如数十二朝兩有臂 茂白芷而愈若專解毒而不固元氣只以圍樂敷塗 毒 調 腫 **並羌翹銀花大劑加減調理而愈** 肉果木香得肢熱疼腫又四君子湯加金銀花黄 捅 虚 暢則毒歸一處成膿而化矣四君子湯加陳与歸 致傷脾胃而瀉嘔厥冷耗散真元者附子理中 而毒滞不化也宜大補氣血而兼解毒得氣血 有謂餘毒而用養血解毒而惟怠毒亦不退此 老四,十 此症若專用解 湯

萬密齊治周氏女出痘發熱五日餘未見痘出但背上 Calling Little 施 張氏女痘起發止空殼此氣有餘而血不足則在 李泉口授一家傳秘方治痘后毒如神人參茯苓銀 用四物湯小柴胡湯雖作膿亦未飽滿而收曰凡痘 瘡不成膿或膿少者皆發癰毒此足厥陰肝病必發 顶疽果然 一腫毒口不可治也非癰乃痘母也三日后果 **E** 绮名 醫 新米 肝 經

腫

雖退而毒內蘊非損手足必腹脹喘急而死矣

萬密齊治胡氏女痘不甚密亦不十分光壯飽滿素畏 動け四月在書 樂不肯服收屬時一片薄殼逆症也足膝發癱毒 花犀角各三线甘线五分羚羊角錢珍珠八分蜜九 能成膿或針之果然清水次日死 盡是不知味而脾敗矣况臏膝乃脾所主脾敗 經云口利則知五味其平素不肯服藥今一飲 一飲而盡口病不可為也問故曰脾主味開竅 錢日一服馬筆 则 而 於 與 不

とこのらんかの 蔡氏子痘后卵腫口此厥陰 肝病用小柴 胡湯加青皮 夏氏子痘后手足發離面色黎黑精神疲困飲食且少 小兒症后發癰用解毒內托散調理而安 益其癰已潰故用是方凡潰癰以是治之無不愈者 小兒痘后發靡用十全大補湯如連翹銀花治之愈 也必不能成體而死果然 **木通查肉調理愈** 日兒症未得起壯收隱太急今發癰毒仍倒陷歸野 络石野板米

費建中曰一兒症止八十三粒或以輕緩之劑於日期 兒半週痘甚稀頗紅活 枚 者也解勿治是晚即死 旁有小毒桃核大隱於肌肉色且黑點此餘毒問馬 規 則 放紅暈城赤病甚焦燥腰及環既發兩癱如掌 如石腫 則找至十六日咸謂收效矣延至二十六日邀視 两目張皇如臨白刃乾嘔不止愁楚非常陰囊 如拳又小疗甚夥以必勝湯日二劑 惟身热如火聚后踩亂宴時 朋 店 兩

我只口人人看

ķ

徐 仲光治一 調 渴便潘仍痘后飲食傷脾脾虚不能制水水潰妄行 水厚朴茯苓 者乃脾胃素有濕熱而無餘毒不盡也宜消積滲濕 地丁當歸收效 解毒以五補散加米仁連翹山梔竹葉防風白木蒼 化毒丹貼之行漸退癰亦膿潰以忍冬解毒湯如 症 膧 脹 一痘后痂未盡脱遍身黄腫壯熱腹渦渦赤 痘后浮腫皮薄而光手按成窟咳

とこり目と言う

峨石 附 斯朱

多为四月月十日 制 星草同水楊根銀花馬蘭頭各傷汁和匀服滿天星 浸清脾土渗透脾膚故腫耳其喘咳者水妄行不能 腰己下腫乃脾胃氣虚不能制腎水水溢下焦故也 葉如芫荽多生橋下陰濕之處 千散治之 治宜補中行濕清熱利便之藥以實脾飲五即散 便潘者由金為火起失其降下之令不能輸化 ,大火盛刑金也人曰水氣上行侵肺最為難治其 一痘后遍身發腫餘毒攻冲也以滿天 Ż. 症后小 不 石

201012 1117 風畜於皮膚流注而為頑核赤色也內服解毒湯外 犀角解毒湯 當利小便以五本散問服牡蠣散又六君加澤寫 敷玉龍散 正散又化毒湯治之 **膚囊赤腫通明乃膀胱熱甚毒氣流結於小腸以** 恣食煎炒辛熱之物熏蒸腸胃熱與血搏而然宜 痘后過身亦腫發為赤遊風者乃餘毒不盡解 附 夏月痘漿足收醫湖赤短潘外 痘后腮頰赤腫為逃毒風者乃容 青石醫 阿索 Ŧ 肾 砌

多灾四月全書 萬密齊治一男子年二十餘甚密起發時腫異常面 小兒痘甚密不甚起發面如錫舒食少而渴或欲投 婦人年二十四五症甚密面腫甚身無完膚七八日 太多氣血不能周徧也數日后自收屬矣果然 湯加當歸亦为防風桔梗牛夢調理而安 本香散曰兒無吐為裡虚之症不可用也乃以保元 或欲投木香散曰痘疹無疾不須服樂色白者痘 錫餅形狀可畏喜其飲食如常大小便調安静而腫 出 如

くいうら とし 唐大尹子年十二症屬后右肩發紅腫非毒也或以針 茂术草芎歸芍川断木香桔梗以仁防風為末山樂 主筋資以養寒則縮熱則脹惟補氣養血則愈用參 能自舉必用左手持之乃能舉此血熟氣虚也益肝 刺之具手遂不能舉視之其手不痛但軟弱無力不 也后必潰爛而死果然 也面瘡帶亦猶是血色未曾化水處爾成膿此惡候 后眉心唇上有成血漿者或謂正當作膿之時曰未 7 **埼名勝頻案** <u>-</u>

徐 多穴四月全書 仲光治一痘后煩熱喘脹便溏溺赤嗜即此暑傷氣 加猪苓澤寫而安 分清暑益氣湯而愈 楜 麻黄以逐脾問之水一服腫減半再以錢氏異功散 以補脾去濕加黃茂以實表防風以勝肌表之 兒痘后洗浴面目一身俱腫此水氣也用四君子 痘 九服半月而愈 倦怠 卷: 濕

徐仲光治一痘后嗜卧烦热喘淌溺赤便溏時值長夏 而愈 痘便溏食少嗜卧亦肥胃虚也六君子湯加香聚仁 痘嘴卧

次足四車全官

Ų

結石問類茶

主

嗜即呼之不醒 晝夜皆然乃氣虚脾弱清氣不能上

不行化工失職宜六君子湯加聚仁木香

一痘后

便鴻減食皆由胃虚不能生氣脾虚不能生血運令

脾胃不足之故用清暑益氣湯治

痘后倦怠酱卧

多りロガ 萬密齊治一小兒痘后發熟不止食少喜睡人黑點乃 常候也今既收則當那盡正復熟退食加神爽乃俱 痘毒内陷也因問其膿水必清痂皮必薄果然不成 夏熟傷元氣以補中益氣湯合生脈散治之 虚元氣弱不能實四肢克肌膚而潤皮毛也况值長 后炎暑嗜即怠惰食少口燥咽乾肌膚枯瘁乃脾胃 升也以五味異功散加歸芍又與歸脾湯愈 不結死但水出皮脱而乾口凡痘初出肚熱昏 症

徐仲光治一痘煩熟口渴能食易化不作肌肉此氣血 不然不可治也后忽昏冒死 痘嬴瘦

飢虚治宜氣血無補单日服五味異功散加黃連 虚乏心火亢而上乘也經曰火炎上則土燥多食亦 冬知母雙日服凹物湯亦有治之不應為毒火爍陰

脉來乘緩此乃脾胃不足東垣口胃伏火邪於氣分 津液枯涸而死 能食枯渴肌肉不長精神憔悴

大己の見た言

Ų

嫡右野類茶

主

多切口がる言 皆山庭后飲食不節脾胃過傷東垣曰脾胃虚弱 肉嬴瘦皮毛枯槁湖熟往來雖食易化乃疳勞之 白芷治之以寫二陽之熟也 此 以補中益氣湯加黃連 別能食脾虚則肌肉削又曰脾胃虚寒則元氣不足 氣下流除火上乘其上位治宜健脾為主而魚 因胃陽有餘脾陰不足故胃食善消內經曰二陽 謂之消二陽者胃與大肠也以小異功散加黄連 表四十 能飲食易飢不長肌肉 痘后面白唇赤 候 ル

飲定四庫全書 泥吃米此由痘后飲食傷脾愈而復傷乃即疳之候 用六味地黄丸 君加炮薑木香 六君子湯治之 清熱之劑則脾土固氣血滋生諸症自平以歸芍四 后面白無精光口氣冷少食羸瘦乃胃氣虚之候以 九加參术當歸枸杞子五味子問服異功散 子湯加石解麥冬地骨皮銀柴胡等劑又六味地黄 N 綺名醫類条 門命火不能生土而成是症者 痘后漸黃瘦面腫身熱肚大吃 痘如前魚以便溏脹漏即用六 二十四 疽

欽定四庫全書 孫文垣治僕子孫守以麻事咳敗無疾上唇厚腫體 七乃去瓜蔓枳殼以其大便己溏加生地當歸於仁 皮是在鱼去白芍桑地骨皮石斛积殼服后數減其熱大便爆靡吸為患以麥冬知母瓜蔓甘草白芍桑 續名醫類案卷四十二 小兒疹 錢塘魏之琇撰

とこうほんは

坊る啓頻米

多文四 日東莊治錢氏子五歲病診泄瀉兒醫謂看最宜於瀉 程氏子七歲中麻西 若謂此兒不治即此麻后虚熱成疳以大蘆薈九治 咳嗽聲啞肌削骨立頭髮盡禿聚醫束手孫見之曰 為製藥與之未服盡而病察 調 此特大方家餘事耳可改解詩 可萬全也病家初不余問者謂非 理而安 蘇吳 呼呼 為為 沙瘄子 一月餘矣後熱如故 兒日 科徐 幼科專門也 者事 非兒 良科 手然

とこの母心動 懼遂不敢再服問三日其父復來見曰諸症復如 吾所闻籍病以發散清凉解毒為主今半身語潮 覺安或阻之曰誤矣小兒有專門豈可令腐儒治之 飲水不絕液縣狀洪緩如平此人口即急矣速投 參白术當歸黃茂陳皮甘草茯苓木香以救之一劑 未退而用温補以不救矣能與人知者收之 其家 吕視之面色兩類嫩紅虚陽時咬牙喘急止四渴甚 不復顧忌以清火為急寒京縱進者服前病勢殊劇 Ą 确名醫類本

急 真寒而外假熟此立齊所發內經微首非深完精 **秋虚也今加寒矣非桂** 者不能信也乃歸而違泉服之一劑而天柱直二劑 之馳至曰果如公言奈何急服前方何如吕曰前方 藥乃述其故吕曰君試急歸兒天柱骨倒矣別去 顷 飲水俱是熟症而公獨云虛寒何也曰陰竭於 何吕曰宣有是理哉君戲我耳曰日來實不服 陽散於外而寒凉復逼之也陽無所歸 附不能挽也曰類紅口渴 刘 喘 内 君 益

多り口片

月月

火色日屋公島 馮 尺更弱成謂疹毒歸臟胃熱改此連出也不知 楚瞻治沈氏兒發熱數日見麻疹幾一 附皆 熏蒸臟腑燥熱蟲不安而出耳沉諸斑疹多由內 唇口焦裂五心壯熱手足指尖皆冷脉細數無倫 而喘渴止三劑起行嬉戲户外 神氣困極此從口出不一而足數日不食下瀉上喘 脱五臟俱困 **也可** 脾虚不能納穀蟲無所食又無虚火 培石 勝初茶 か 如 見 苦 日面上盡 切劑 神 小故 兩 沒 氣

重乎面上退縮者陽虚不能升發也喘促者氣短 續也唇焦者那津耗弱也五心壯熟者陰虧火樂也 氣 泄瀉不食者真失東而那不運也寸觸細数尺弱 今者之急本氣欲脱也倘謂麻 疹 餘毒解利清托 紅而城發血虚氣弱則色白而隱伏有何毒之輕 神氣先盡矣乃以熟地六錢丹皮一錢麥冬三錢 虚 血虚虚火上浮而不藏也急则治標緩則 胛胃不足是以荣氣还行陰覆於外血盛氣壮 治 難 者 本

多いじん

1:17:12

湯冲服三四劑全愈 更倦此陰已少復當補氣以助其發生前方另煎人 久虚之故也再用前方加炒黄白木二錢去丹皮參 牛膝二錢製附六分一劑假熟全消真虚畢露神氣 参二錢中服神氣漸爽喘促全安飲粥微嘔乃胃氣 透一切風燥寒熱之劑不可入也余常遇表散過 為程法也大抵麻疹之發本諸肺胃治之但宜鬆 愚按此與吕在大同小異要是百中一二未可執

賣名醫師案

高士宗長男六歲次男三歲於元旦次日俱發熱見疹 多穴四月全書 長男七月而生先天怯弱問其胸腹寬否曰機甚口 即用清透發之劑次日器增十數點完不暢達心以 味何如口淡甚因知其虚遂投茂术参甘桂枝紅花 頻咳嗽至一月而安由見點之初過服表劑虚其 甚綿延不已者一以生地祀子地骨麥冬葽仁沙 参等味三四劑以收止熱退而安 二劑次日透發遍身熱稍退而人情猶煩躁夜發 CADDIN LILIA 是不能言矣計無所施針百會穴開其看門服 牛黄散即大黄末也一服而痰喘止神氣稍平却自 點不增又與紫蘇慈薑芫荽等熏之熨之疹總不 不 透必寒凝毒甚因與蘇麻前右黃本石膏樂片 服麻杏桂枝石膏一劑而愈謂其稟質暴强其疹脉故也勞者多矣次男幼稚致問不能以上冬疾 至五六日吐此或曰此熱極生蟲可服牛黃 **表知** 是經 Į 也同道俱云舎透法並無別法 讀名醫額家 劑而愈謂其稟質器强其疹 追此 止等 西 出 紅

汪氏子出曆己三日自用前杏麻黃石膏藥一二劑 攻發則敗矣急與芎歸茂术桂苓紅花一劑而熟退 身安凡治疹調其氣血和其經絡寒凉攻發概置 出二十點餘不能再增心胸煩悶乞高診高曰若 濟矣勉投參附完無挽 衛生曰此大虚大寒症也今既無言又不能食恐無 許及諸单方沒熟 經云一逆尚引年再逆促命期為醫者可不鑒諸 郎親其形在實不能生太人張 回 再

銀定四库全書

文已可見 A 1000 具題先子甫二歲出君醫改發不透高視之知其虚 夏氏子出将色紫黯神氣不寧髙曰此症大凶治須得 次日仍用原方加人參一錢又連服獨參湯而愈 遂與茂术薑桂歸芍苓甘銀花紅花諸味一劑而安 益其臟腑安其肠胃助其氣血方可語無筋節則 也曰若但發府曆斷不出必至不你惟有温補之 法連看二次皆用温散藥次早其家人走告口口吃 用 則屢治屢效也亦非定論 結不問類本 過益 正鑒 劑 胸

多万口人人 徐仲光治一兒身熱喘脹以內傷外感治之不效视其 其家猫懷 盡另有樂否曰昨二劑俱服否曰尚存一劑因與 背隱隱赤色乃疹也以麻黄湯表發雖出而頭面 愈曰服藥后因無力相延仗天覆庇得以漸愈語 子八分令加入煎服自此遂無音耗心竊越三載至 以上皆醫藥真傳高來 兒疹 見其子長大因問昔年出看吐蚘 ķ. 何由 不 得 附 活亦

とこのは かんこう 而后愈 兒疹身熟似症候偏身報點沈虚明黄錦雲皆以為 兒疹出紫色喘嗽喊瀉不食用解毒飲挑痧法治之 作疹者則早得其要領也 洋豈非疹乎已而果然后長遂為明醫 虚也時黃綺雲年十二歲未知醫往視獨以為疹其 出隨沒而死 父訴之綺雲囚兒聞父言疹為肺胃風熱今两鼻流 是以鼻涕

楠名 密斯米

一兒珍不易透知為風寒所過用桂枝湯加葛根麻黄 紀身熟頭疼骨痛咳嗽氣急嘔喊不食乃傷寒而兼 兒疹出紫色便秘溺涩煩躁悶亂急以大柴胡湯利 林下而愈 前胡升發之人用厚被裹之再以大劑防風湯熏於 之而愈 人学蘇羌姜酒憂之 山疹也以百祥散十神解毒湯治之愈 此症治之 此症亦可用芫荽防風湯浴頭面手足 Ķ.

兒疹出腹飽便秘乃內傷所發也以承氣下之而愈 兒表散后疹出隱隱肌肉間成片又為風寒所鬱渾 兒疹正出而恣食停滞腹飽便秘壯熟站語急以大 加葛根以升發之得冷汗微出而愈 身青紫煩躁悶亂喘脹欲出不出急用麻黄桂枝湯 黄瓜蔓枳實厚朴黄連甘草等樂利之而尚喘嗽脉 小緩疹雖透必變紫黑悶亂喘脹而死 遲肢冷以附子理中湯又歸芍六君湯治之而愈

次定四草全十

榜名 醫類茶

兒疹盡出而壯熱秘結喘脹站語此毒壅猶不盡透 兒疹隐不振頭面不出面色青白喘脹悶亂右寸脉 也急以黄連爪蔓枳殼石膏桑皮知母人中黄等藥; 微此正 氣虚也不能升毒急用麻黄桂枝湯加人参 急以麻黄甘草桔梗前胡葛根荆芥牛蒡枳殼升發 兒疹半出壯熱煩躁喘脹悶亂乃出不透而內攻也 之疹出二三番得盡透而愈 錢防風芫荽湯浴法治之而愈 冬

兒汗出疹透猶喘不止亦邪壅也急以炒黑麻黄加 兒仲春出疹用凉藥食生梨寒鬱而沒喘問面青肢 兒疹時咳嗽喘急用大小無比散五分至一錢即喘 蘇生薑升發之再覆以被取汗而愈 定而睡醒后神安此熱從小便而解也 石膏杏仁甘草治之而愈 治之而愈 冷聲啞昏暈急以麻黃湯加為根柴胡甘草桔梗紫

欠己日草 全島

人 醫 類茶

賀知忍少子疹不透極重其家不知尚以肉飯與之仲 兒疹雖出而喘及甚乃驟用麻燥烈之藥火甚而肺 治而愈 火熱也宜清金潤肺以甘草桔梗前胡牛莠杏仁元 参知母黄芩花粉治之而愈 麥冬三錢五分牛蒡三錢五分蟬退荆芥薄荷知母 兒疼發不出喘嗽煩躁悶亂繆仲淳用西河柳五錢 錢竹葉三十片甚者加石膏五錢冬米或三黃

兒寒月出疹不透喘脹悶亂煩躁用去節麻黃蜜炒 甘草西河柳一 錢竹葉二百片濃煎與服遂定而蹇淚 酒 赤連服四服疹盡出而煩躁猶不止再以石膏三兩 母各三錢竹葉七十片作二劑服而疹盡現獨身皆 淳急以西柳兩許石膏一两五錢知母五錢元參貝 知母西河柳各二兩麥冬三兩黄芩黄蘗黄連各五 拌炒一 錢為根本麥冬貝母前胡知母荆於元參 一服而疹立透隨愈 筆

友民四年 台馬

矮七 醫類条

東野巴居 名言 之而愈 孕婦疹不出熱極問亂喘脹用清熱安胎藥而熱 甚危劇處子母難全此懷胎內熱故也法當下其 新婚出疹疾哦不止成謂餘毒用清解而疾愈多午 知母麥冬治之而愈 后咳甚此陰虚火熾而潮熱也用六味地黃九料加 珍熱解而母命可保矣以表散無堕胎樂治之而 新婚出疹其症如前用六味地黄凡料加當歸治 各凹 胎 愈

孕婦出疹熱極堕胎而難産用魚膠三寸燒存性麝 孕婦出疹小腹痛而漏血此熱甚動胎也以升麻葛 躁喘悶昏絕乃血脱故也當魚益氣用理中湯而甦 孕婦出疹觸動其胎胎堕而去血過多疹雖沒而煩 膠治之血止而安 根湯加荆芥紫蘇黄苓白木當歸川芎砂仁橘紅 愈 一用人参一两當歸阿膠炮畫荆芥文葉治之而愈 阿

Child not be too

續名醫斯茶

我分四月石重 血 産婦珍不易出熟甚而去血不止乃氣血不足不能 婦疹后輕咳朝凉落熟面色少神肌瘦唇赤咸以氣 逐毒出外也用麻黄葛根湯加人參荆芥白芷當歸 用魚膠一尺如前治法雖産而子不活 香一分共河服立産遇此症最為難治更有横生者 阿膠治之而愈 黄九合生脉散與服之又嘱其絕欲百日而寒 不足用八珍湯治之細訊其夫知不慎房用六味

2.10 in 2.11 柴 與青治候補汪某年二十餘因感時氣出疹過服石 能過堂學籤謂已平復十九日當投補劑定可全愈 禁一錢三日熟退思食因是月應選身軟耳韓慮不 傷肠亦且傷陰用麥冬五錢滋陰以清虚熱陳皮以 膏等劑身熱泄瀉兩耳皆雖絕不思食脉之兩尺微 亦覺潤惟左寸脉微洪加小生地二錢木通一錢菊 弱舌上乾燥毫無津液本属陰虧况大寒之劑不但 胃氣加西河柳一錢以清疹毒次日熱微寫止舌 續名醫類米 +1

多灾匹库全書 萬密齊治吳道松四肢病疹或治之三日疹不出煩躁 甘氏子發熱疹三日不出身凉神後坐卧不寧此毒不 甚欲用荆防敗毒散曰此皆發熱之藥無解毒之用 后果如言竟得赴選 外出毒火内伏也故煩而坐卧不安用升麻葛根湯 加元参升麻一服疹出三日起 愈虧陰陽不和此疹之所以不出也以東垣凉膈 况天大熟又無時令之藥一二味在內則陽愈勝陰 卷; 四; 散

てこういる たけら 錢乙診脏親宫中十大王瘡疹云曰瘡疹始終出未 楊氏子疹后痢下解血用當歸稍生地白芍條芩炒黄 方皆效 他症不可下但當用平和樂頻與乳食不受風冷可 連炒人參生甘草枳殼烏梅而愈凡出疹利血者 用四物湯加防風一 如瘡疹三日不出或出不快即微發之 麻黄石膏以發之一 Ą 騎名醫類案 一服疹盡出色白不紅此血虚 服色紅而愈 湯之料子 有 此

發之 悶 當解毒型散之 即 瘡發后不多出即 '瘡若起能食者大黄下一二行即止有大熟者當 瘡本稀不可更發也有大熟者當利小便小熟 亂大吐此當利小便不應者宜宣風散下之也若 不黑慎勿下身熱煩躁腹滿而喘大小便潘面 小便有小熟者宜解毒若黑紫乾陷者百样九 獨活麻葛 黄根 類若不快勿發勿下攻止用抱龍 桂芜 加樂 枝活 之防 類風 即如加一 如發后不多及脉平無 至日 二一帖帖 カロ 藥不出即 赤 者 症 治 大

多灾匹

戽

全書

卷.1

次已日年在時 **睦親宫十太尉瘡疹衆醫治之王曰珍未出属何臟腑** 以對錢氏曰夫胎在腹月至六七則己成形食母腹 毒錢氏曰若言胃氣熟何以乍凉乍熟若言母腹中 著痂也 也宜宣風散導之用生犀角磨汁解之使熱不生必 有毒属何臟也醫曰在脾胃錢氏曰何以驚悸皆無 五七日痴不焦是内熱氣蒸於皮中故瘡不得焦痂 醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫云在母腹中有 續名階類茶 17

多りせん 者此五臟症俱見也吹呵欠頓問者肝也時發驚者 炣 之時熱動五臟則五臟之症先見初欲病時先可 粉 心也乍凉乍熟手足冷者脾也面赤 因微寒又遇風寒邪氣相搏而成痘疹也未出欲 D 猶有不潔產母以手拭净則無疾病俗以黃連汞 悶驚悸乍凉乍熱手足冷面 下其邪糞之穢此亦 機液入兒五臟食至十月即機液滿門至生時兒 17 ¥. + = 知不潔餘氣入兒臟中本先 闒 颊亦燥咳吸喷嚏 则 頰咳嗽吩 作

たこのほから 此 無他症當用平和樂為治因用抱龍九數服愈為 疹腎雖無症其后惡者瘡變倒靨而黑陷則歸腎也 乃五臟毒若出歸一症肝水泡 由不慎風冷而不能食内虚所致也今太尉疹 以橋曰麻也寒邪外乘閉而不出是呱呱爾飲 凶 者肺也惟肾無候以在腑下不能食故也凡瘡 治妊孫始孩 句 勿認作寒症 界日發熱蒸蒸驚搖情情眾醫不 用外抱由 緒名醫期集 龍不 九慎 即知外班而 肺膿泡心為斑脾 疹多 不能 热食 土五 也内 虚 為 和

金公四月在言 薛立齊治一小兒患疹作痛發熱煩渴欲服清凉飲下 並效集品 表在裡及邪之微甚而治之王海藏曰前人云首尾)‡] 之於其脉不實舉指不數此邪在經絡也不可下遂 令保母抱子坐湯侧稍遠擁被圍之湯氣白遠薰蒸 、飲樂內托麻出而解后汪氏子病如子亦用嚮法 數中氣乃傷藥不足恃也當置沸湯一 解毒防風湯二劑而愈此在小兒多患之須審在 衷 - 概撒其蓋

.). 兒作痒發熱以消毒犀角飲一 不實無一 則 愈 下也尾不可下者為斑毒已顯於外內無根蒂大便 下俱出也毒自解少頃吐瀉俱止其症果消吐瀉 見七至此小兒和平之脉也邪己盡矣不須治 邪氣不得伸越此脉症有表而無裡故禁首不 潔古云與珍之病其為在各異發級腫於外者 不可下者何也曰首不可下者為班未見於表下 切 7 裡症下則斑氣逆陷故禁尾不可下也 黄ろ皆質矣 劑作吐寫此那氣 + 属 果 后 可 上

銀定匹库全書 沈 第出使兒易見也身温暖者順身凉者逆 難 少陽三焦相火也謂之斑小紅屬行皮膚之中不出 明生治沈翰臣婦咳嗽發熱或認為不足處用六味 多發表之藥少秘則微疎之令邪氣不壅併令其次 勿亂治而多吉謂邪火上下皆出也斑疹並出小 者属少陰君火也謂之疹凡顯斑 黃湯以滋陰分既而咳逆更劇疹之脉浮且數 禁是以列生他在也首尾不可下大抵安裡之 春点 四:/ 十 | 二 | 炡 若自吐瀉者 夗 藥 慎

ていうう こう 為熟經云邪并於陽則陽熱而陰虚始則疹在欲 疹退按斑疹之候雖異斑疹之治器同是蔵丁未 졝] 候曷足怪乎行且止矣果越两日而牧寧寫止身凉 未收之時熱下移於手陽明而作瀉是亦斑疹家常 未出之際火上炎於手太陽而作吸今則疹在欲收 作寫不己咸歸谷寒凉沈笑曰非也肺受風邪 熱干乎肺家宜用疎表之劑服下遍身發出紅麥二 · 嗽差緩而猶未透更用辛凉等味以清表熱忽復 Q 讀名醫問案 ナ 邪變 出

易灾四月全書 質 在泉之餘氣耳是以初當凉解而不利乎温散次當 寒潤而不宜於温補六味地黄九之属雖若相宜 土司天而春夏之交燥旱殊甚益猶襲夫昨歲燥金 而餘熱未清之時稍為近理今初熟始收縣然用 齊假使九原可作視近日之湯法盛行能無掩 非滋陰乃滋害也沉以九為湯己非古人本意 投泛用尤非病變之機自來善用六味者無若 濁味厚不惟不能達表抑且銅散外邪施諸疹退 基四十二: 然 而

=	 	 	 	
Krida in his mil				胡盧哉
A				
綾名醫類案				
+^.				

たとり早から 程世光治憲王誕長子初生時不知吃乳程曰此因難 欽定四庫全書 舟工生子脆而無皮程令取土数升粉其體即成肌 産兒傷氣也持人參煎湯灌半匙即吃江西 續名醫類案卷四十三 小兒初生 3 結名醫板米 錢塘魏之琇撰

太原王相公始生冷無氣母驚謂己死有隣姬徐氏者 紀生恆地不啼擊水脈边猶令叫即啼又俗稱不啼兒 中症公母當下樓調巫見一白衣人長大餘間立凝 及殺婦視良久笑曰此俗名卧胞生吾能治之當活 左手拘兒后手搁其背百餘迎時處下而醒後六歲 活 若有所言母驚什樓下以為不祥然竟無意見以 則當贵但不免多病累阿母斗趣使治之其法用

これでき たたう 有舟人生子無皮人莫能曉適吳門為可久出醫眾告 免初生不飲乳及不小便用葱白一寸四破之以乳 之且戒勿動久之可外回故食視之己生膚矣益其 為問寂生旁人呼其父名父應兒即啼物理 母懷妮舟中久不登岸失受土氣故也與前程 之可久就岸畔令作一块置兒其中以細土隔食覆 方止 按危氏得效方云宜速用白早米粉乾撰候生皮 續名醫頻奏 围 业

多灾四年全書 萬密齊孫周歲生走馬疳用尿桶底白垽刮下新尾上 小兒初生下遍身如魚泡又如水晶碎則成水流渗用 傅之神效名曰不二散 白礬一錢共研末先用臘茶葉浸米泔水洗净以藥 蜜陀僧研絹羅內羅過乾糁仍服蘇合香九同 汁銀石器煎灌之立效す 火焙乾五分五倍子内蟲灰三分鼠婦焙乾三分枯 小兜走馬牙疳

萬密齊治鄭斗門子初生五日不乳噴嚏昏睡萬視之 朱丹溪治走馬牙府鹽退紙燒灰存性入麝香少許蜜 急乃視其口中上腭有白泡如珠大者三四個用銀 曰此臍風病也一名馬牙疳小兒一 和敷患處加白礬尤妙 不乳有老姬語以臍風之害乃速萬再治且問臍風 針挑去之斗門憐惜之情見於面去之未盡次日 小兒臍風 腸一旬之內尤 猶

シスコラ いき ノンユン

4

續名簡類家

故宜急治之但見噴嚏多啼少乳即視其口中上 萬曰數日之兒安能任藥雖有古方不敢用也回 名曰禁風環口青色口唇緊撮名曰撮口令郎 之病云何萬口其病不可治者三臍腹腫脹大小 不通者名曰鎖肚口緊不開不乳不啼而時作掐 落不謹視之為兒尿所浸及為風寒濕熱所侵之 茶何萬曰無害矣此病益初生時洗浴之後臍 至困也復以手法去其白泡而安又曰當何用藥 初 腭 然 乾 者 便 病

多穴四母全書

卷四十三

薛立齊治一小兒腿如霞游走不定先以麻油塗患處 小兒患之外勢雖輕內苦便秘此患在臟也服大連 請詳記之以為育嬰之訓 中或為鎖肚為禁風為撮口雖有神丹不能救也鄭 找净其血則臍風不發矣若不知此則其泡流入腹 有白泡子成聚是其候也隨以手法刮去之以軟帛 砭出惡血其毒即散用九味解毒散一劑而愈 小兒赤丹即遊風

次記回車全書

結名留新茶

すりに 立齊治一小兒過身皆亦砭之投解毒藥即愈 萬密齊口一小兒炒發於臉眼中紅腫手不可近三日 砭去惡血為善如腫起赤色遊走不定者宜先以生 毒熟血驗畜於命門遇相火而合起也如霞片者須 過身亦亦不從砭治致毒氣入腹遂不敗此症乃惡 死 翹飲敷神功散而瘥 油塗患處砭之以沒其毒九從四肢起入腹者不 小り

又引力量 /ichin 莊敛之子未及三月乳母不善於養盛暑中極食令即 竹葉麥冬生甘草連翹貝母生稍黃令煎與乳母服 服別疏方用判於聽牛等生地丹皮元參花粉薄荷 数月奈何苦之以藥急以犀角絞鮮梨汁磨服問故 忽患丹毒遍遊四肢漸延腹背倉皇來告予回兒方 口犀角能解心热而熱汁更能豁痰且味甘則兒易 稍重者不用砭法俱不枚也 雖云丹有數種治有數法無如砭之為善常見患 婚名辯筠案

多分に月るさ 立齊治共刑部静之子甫周歲患丹毒延及遍身如血 馬銘鞠傳治下部火丹用蠶砂山槌黃連黃芩黄蘗大 黃連木密和雞子清調服馬云若遇抱頭火丹必砭 黄石膏共末水調數上立效切勿用芭蕉根又方用 染用磁鋒擊刺遍身出黑血以神功散塗之查春田 去惡血方效每用此法治人其不肯砭者多誤事 盡退後率以乳母不戒患驚風而獨無筆 之乳汁即湯液矣依法治之一日夜赤漸淡越日丹 **本四十三** 大元日神山山 樂十指拳攀膿水津溫先用秦光地黄湯手指如常 遥散而愈後傷風熱起疙瘩搔破出水或用大麻風 從四肢起入腹者不治子當刺毒未入腹者無不效 用大連翹飲而愈 前治之而愈金氏子不欲刺毒入腹而死河間云丹 用易老祛風九而瘡亦愈 兒患赤遊風先用羌活白立散二劑又用加味 兜 胎毒 缝名醫類案 王國戚子未獨月陰囊患此如 六 逍

銀穴四月百言 萬密齊長孫生下遍身生瘡於因製一方用烏科蛇酒 發矣 如栗米大每服十五九竹葉煎湯下蟲疥滅迹不再 燈心煎湯下利黄涎瘡復出而安或問曰蟲亦不可 於萬日幸未發播尚可治也乃與雄黄解毒凡竹葉 浸去皮骨取净肉焙乾一錢苦參酒浸切片晒乾 兒身生蟲所醫用藥樣之瘡盡沒腹脹而喘求藥 ,錢半白蒺藜炒去刺一錢半三味為末酒糊九 取

COLD IN LILE 慎 啼忽一日其瘡盡隱發搐而死 兒生下一月後遍身蟲亦浸淫濕爛其皮 爾月小兒先於口內生瘡後延於身年餘不愈以土 礵 不可妄用搽藥逼之使及於內也探瘡之藥必用砒 茯苓為末乳汁調服母以白湯調服月餘 搽乎曰蟲亦者胎毒也宜用解毒之樂使毒散於外 水銀以殺蟲樂毒之氣乘虚入裡誤兒性命切宜 結名醫類案 八如脱日夜 而愈

銀灰四库全書 馮 傅 大毒 两 苓木通節大劑乳母日夜進 赤 煎 遍 足潰爛清水淋漓指甲皆脱乳母傍人近者莫 湯 體賴瘡未少 染 **芍草解首鳥銀花連翹土貝甘草繁虱胡麻土花** 瞻治其孫因母久思陰虚夜熟之症生下百餘 **數劑高腫潰膿** 此先天熱毒之氣己盡出外矣後於耳後 此陰虚無根之火凝聚也以八味加牛膝 所非 致其 数 案母 而愈自後津液衰酒瘡屬 四十二月 见妊 **産時** 難久門服 服数十虧後濕熱下趨 Vス 生地當歸丹 乾 <u>£</u> 結 味 皮 枯 不 Ð

次足四百全島 · 劉 樂無益而日益劇蔓延半身號啼不乳不睡用雞子 亦痊 或愈或發防其內攻乃以羊肉四兩煎湯入生黃芪 ,禹錫傳信方云項在武陵生子 尊內便有熱瘡塗諸 枚煎與服不及十劑足瘡全愈升於頭項再服頭瘡 四錢當歸二錢銀花三錢炒升麻四分薑三片來二 五秋煮熟去白取黄置髮中乃有液出旋取置椀中 液盡為度取塗瘡上即以苦參末榜之果神效 給名簡切米

萬密齊治一兒五歲每至春時則遍身生膿泡瘡此胎 薛立齊治一小兒自脫胎時两目亦腫或作痒或生翳 多りで 孫文垣治一兒耳後生一毒腫痛遍身生大疱瘡增寒 参两劑而消 毒也成用探樂恐粉砒之毒乘虚入腹以胡麻服之 此胎内之肝火也用蘆薈六味二九而愈 發熱與金銀花當歸尾甘草亦巧連翹便鹽牛等元 E

欠己日 東小町 黄州李四守生子五月遍身濕於一旦盡乾萬曰瘡出 立齊治孫閣老孫甫周歲項患胎毒俟其有膿刺之腺 脖 鮮不斃矣 而愈 驚止始無憂也連更数醫不能治 患此待膿自出幾至不救吾鄉徐內翰子患症者 出稅許乳食如常用托裡藥月餘而愈新閱老子亦 針刺毒不內侵数日而愈小兒氣血弱膿成不針 好名醫類茶

多少口压 有言 張子和治一小兒寐而不審諸醫作睡衛治之或欲以 甘而戀膈酒氣湍乳兒亦醉也乃則甘草葛花砂仁 也乃竊訊其乳母爾三日前曾飲醉酒否遽然笑曰 平和曰若驚風之脉當洪大而强分則平和非驚風 子平日無疾何驟有驚乎以問張張於其兩手脉皆 夫人以煮酒见的酒味甚美三飲一嬰而腫陳酒味 艾火灸之或以大驚九及水銀餅子治之其父曰此 小兒乳病

萬密齊治本縣胡正衛子二月發熱不乳萬視之雖似 變蒸非變症也時乳母皆肥健者必因傷乳發熱也 貫仲煎汁飲之立醒

李立之治一嬰兒忽患看求治立之令以衆襄小兒乘 高投之地兒不覺大驚遂發聲能言問之曰此乳搐 令損之次日熱退而安

とこり早から 心也非藥石所能療其術之高大率類此杭州 兒九候歲吐乳便黃身有微熟萬曰此傷熟乳

绮名醫類案

多灾四角在書 御史陳公忽小兒閉目口不出聲手足俱輕急延醫治 哺兒此淫火之邪忤兒脾胃正氣也不治之必成癖 醉耳濃煎六安茶飲數匙便醒御史撫掌大笑曰 則為癖矣宜為肝補胖乃與為人胃苓九服之而愈 **矣益淫火者肝火也病則發搐癖者脾病也積不** 必傷交媚得之問何為交媚曰父母交感之後以乳 獨孟友荆一見便云公子無病乃飲酒乳過多沈 作腥氣今己成積母曰未食熟物乃密語其父曰 消

DOID TO LAND 王三奉子二歲多病萬視之曰此乳少病也王曰兒乳 之擇一 復求治曰欲使即換乳母則兒認慣不可與也若 自 極多萬不應遂行既而其母驗其乳姐果無乳也詢 之矣可謂良醫精血度 畫則嚼飯以哺之或啖以粑果夜則貯水以飲之 相 有乳婦人哺之則疾終難治也不若仍與舊母養 親矣王曰有乳無乳治法異乎曰有乳之疳得 少此有乳者夜則相伴以乳補之久而慣熟 **待名野狗茶**

多灾四角在書 陸養愚治姚明水兒前一歲其母無乳乃以糕餅聚 哺之遂患疳積痢上則口舌腐爛下則膿血相 而 之傷乳乃飽病也宜集勝九無乳之疳得之失乳 療半載內削如柴飲食少進醫謂上疳下痢睡不 饑病也宜肥 兒九詞理一月 而安 EJ 肛 神 外脱而 在以一 門如竹筒指統己過命屬不可為矣診之形 指按其脉上浮数而微下沈 非竹筒也比上越者不降下陷者不 卷四十三. 徴 而数 雑 其 脱 ろ 別 治 柿

萬密齊治楚泉之子九月發熱恐是痘疹召萬往視之 薛立齊治一小兒目睛緩視大便臭穢乃飲交感時乳 所致用四君子加木香藿香治之而安 而减旬日全安 匙桃灌之間以孩兒茶氷片青黛人中白吹之二日 若升其元陽降其邪火猶可生也先與補中益氣湯 一殘以提其不足之陽又濃煎生脉散俟冷時時以 兒變然

KIND INT.

結名問對茶

<u>+</u>

吳字先治一小兒咽喉忽腫 脹痛甚米飲湯水不下危 多プロル有量 次日果安 心也項急頓問肝也咳嗽噴嚏肺也吐瀉昏睡脾也 曰症者五臟之液毒也故每臟各見一症呵欠驚悸 變蒸之期以症察之亦無症疹之候曰症症云何萬 身體皆凉腎也今公子無之知非痘乃變蒸将退也 **痘乃變蒸也曰何以辨之萬曰以日計之入當有** 兒喉古澤順 卷四

巢氏云小兒滯順者涎流出而漬於順間也此由脾冷 甚吳曰此名鎖喉風以銀針刺少商然二穴出血其 喉 即寬與之茶即下咽無苦飲食遂進 挺多故也脾之夜為涎脾胃虚冷不能收制其津液 功散加釣藤鉤而愈 也弄舌者脾經虚熟時舒時效也照新南成方用異 與吐舌不同薛新甫云吐舌者脾經實熱而舌長出 小兒不時舌出以清凉藥治之不愈具曰此名弄舌

2 8. 10 rat 1. 1.15

結名醫類案

+

銀河四月月百十 萬密齊外孫滿口生瘡咽喉唇舌皆是為製方用蘇連 兒患口舌生瘡所搽所服皆苓連知藥之類無效 心熱所作苦入心反助其熱宜無效乃作洗心散與 其涎自不出亦截法也益黄散亦治此症温脾散亦 故流出於順也張氏温脾丹主之一法百藥煎含照 效乃奇方也 錢朱砂白辔五分鼠婦焙乾三分共研細數之立 十東 書垣 回

蔣仲芳治一小兒初患舌碎既而遍身發熟或謂傷風 之效 用洗心散入竹葉煎服以解其裡熱外用藥連散樣 停食與發散消導曰無益也服後果熟愈而湯水難 小兒舌上生瘡口唇破裂吃乳不得日夜啼哭求治 草等分水煎服更用蘇連散樣之仍用 服而安大黄麻黄白木當歸白芍荆芥薄荷甘 兒古 1 奇巴路河美 +

欽定匹庫全書 蔣仲芳治一 耳 效一日忽作鴉聲少頃其音己啞魚口開張視之欲 舌碎知其心火亢甚加之身熟是内熱極而火外行 故曰若先身熟而微舌碎則因風食發熱所致今先 哭狀惟眉頭稍微終無音因以指 小兒曆 乃以黄連五錢好是煎湯徐徐與之終劑而愈問 一小兒二三歲身熟驚悸易醫六七俱無寸 探其口中唇針

スニフロ in /i Lin 聲復出又一日而音始全而愈自後此法活人無數 竹葉等到一大劑煎成薄膏類類與之一晝夜而鴉 唇乾舌燥然屬陽症此法甚善故記之 加金子同煎嗟乎世遇啞驚風俱棄之而不治孰知 大便三四日不行者加元明粉二三錢尤驗繁悸者 石膏麥冬五味山梔元參花粉知母甘草薄荷燈心 舌燥曰心熱欲言而不能果有之乎即以黃連黄芩 4 續名醫類案 土

多灾四库全書 續名醫類案卷四十三